

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD R.P. 177 21205 BEAUNE Cédex

ABONNEMENT ANNUEL 290 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 3 500 28 0



☎ 80.26.35.45

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n°26 - 17 Novembre 1994

COLZA

Insectes Pas de captures. Fin du risque. Nous vous communiquerons dans un prochain bulletin, le

pourcentage de pieds porteurs de larves de charançon du bourgeon terminal.

Maladies : Situation saine en général.

CEREALES

STADE 2 F à tallage.

Pucerons et jaunisse nanisante (JN0)

Les nombreux passages pluvieux observés ces dernières semaines limitent les migrations de populations :

les captures à la tour d'Auxerre sont très faibles, voire nulles, depuis le 22 octobre.

la présence de pucerons dans les parcelles est exceptionnelle le pourcentage de pieds porteurs est le plus souvent proche de zéro (21 - 25 - 39 - 58 - 70 - Nord et Est 71 - 89). De rares parcelles, situées à proximité de repousses, friches, et abritées des vents, voisinent ou dépassent le seuil de 10-15 % de plantes touchées.

Le pouvoir virulifère des pucerons, analysé par le laboratoire de Beaune est toujours nul.

PRECONISATION

■ *Tous secteurs hors Mâconnais* en général pas d'intervention. Seules quelques parcelles abritées pourraient justifier un traitement si 10 % de pieds ou plus sont porteurs d'au moins un puceron. Rester vigilant tant que le temps doux persiste ; les pucerons ne sont détruits que quand les températures descendent en dessous de -5, -6°C.

■ *Sud Saône et Loire* le fort taux de population nécessite une intervention anti-pucerons dès que les conditions le permettent.

Cicadelles : Risque terminé.

Maladies

L'oïdium est très présent, notamment sur orges ; il n'est pas rare de constater 50-80 % voire 100 % de pieds porteurs de pustules.

Les symptômes d'Helminthosporiose (parfois de Rhynchosporiose) sont également fréquents.

Sur blé, outre l'oïdium, on note l'existence de quelques pustules de rouille brune.

PRECONISATION : Aucune rentabilité d'un fongicide à l'automne n'a été démontrée.

Cas particulier : le Sud de la Saône et Loire

Au Sud de Mâcon, les populations sont en nette progression depuis le précédent contrôle du 02/11/94, avec présence de quelques ailés mais surtout de jeunes colonies d'aptères.

Commune	Culture	Stade	% pieds porteurs
La Chapelle de Guinchay 1	Blé	2 F	54 %
La Chapelle de Guinchay 2	Blé	tallage	48 %
Vinzelles	Blé	2 F	54 %
Romanèche	Blé	2-3 F	40 %
St Symphorien d'Ancelles	Blé	3 F	54 %

RESULTATS D'EXPERIMENTATION

Trois réunions de présentation auront lieu en BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

- le 15 Décembre 1994 en Côte d'Or (à Dijon)
- le 16 Décembre 1994 en Franche-Comté (à Besançon Ouest)
- le 20 Décembre 1994 dans l'Yonne (à Auxerre)

Nous vous préciserons dans un prochain bulletin les lieux exacts et les programmes. Contrairement aux deux années précédentes, le programme sera différent d'une réunion à l'autre.